Agromil® V

Boletín técnico

DIFERENCIADORES

- Tecnología de extracción de alta purificación.
- Alta estabilidad de ingredientes.
- Versatilidad de aplicación aún en ultra bajo volumen.
- Totalmente soluble.
- Libre de metales pesados.
- Vida de anaquel prolongada.

Agroenzymas® MX

Hacer de tus sueños una historia de éxito.

Agromil V Es una mezcla de compuestos bioactivos de origen natural que por la tecnología de extracción y tipo de formulación se convierte en la mejor opción para potencializar los procesos de crecimiento y diferenciación celular que se presentan durante el desarrollo de los cultivos.

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Ajo, brócoli, lechuga y cebolla	**500mL/ha por aplicación**	1a. De 2 a 3 pares de hojas. 2a. De 1 a 2 semanas después.
Alfalfa	**500mL/ha por aplicación**	Aplicaciones mensuales, aplicando después del corte 3 días después del riego.
Algodón	**500mL/ha por aplicación**	1a. Al inicio del cuadreo. 2a. De 3 a 4 semanas después.
Chile, tomate, garbanzo, frijol, pepino, calabaza y soya	**500mL/ha por aplicación**	1a. Al inicio de la floración. 2a. De 3 a 4 semanas después.
Fresa	**500mL/ha por aplicación**	Aplicaciones mensuales, desde el inicio de la floración.
Mango, cítricos y aguacate	**1mL/L de agua por aplicación**	1a. Al inicio de la floración. 2a. Con frutillo tamaño canica.
Manazana, pera, ciruelo guayaba, durazno, y nogal	**1mL/L de agua por aplicación**	Cuando existen del 30 al 50% de floración.
Melón y sandía	**500 - 1000 mL/ha**	1a. Al inicio de la floración. 2a. De 3 a 4 semanas después.
Ornamentales	**1mL/L de agua por aplicación**	1a. De 10 a 20 cm de altura. 2a. De 3 a 4 semanas después.
Papa	**500 mL/ ha por aplicación**	1a. Al inicio de la formación del tubérculo. 2a. De 3 a 4 semanas después.
Piña	**1mL/L de agua por aplicación**	1a. A la formación de la cabeza. 2a. De 3 a 4 semanas después.
Plátano	**1mL/L agua por aplicación**	Aplicaciónes mensuales.
Trigo, arroz, cebada y avena	**500 - 750 mL/ha**	Al amacollamiento.
Vid	**1mL/L de agua por aplicación**	Cuando el brote tenga 10 cm de longitud.
Caña y Maíz	**1000 mL/ha**	De 6 - 8 hojas.